

*Euphydryas aurinia*



© F. Ollivreau



© F. Ollivreau

## Description de l'espèce

Ce papillon d'une envergure moyenne de 35 mm présente un aspect chamarré avec l'alternance de taches orangées, noires, blanchâtres à jaunes à la face supérieure des ailes.

Les chenilles, noires et couvertes d'une dense pilosité, vivent en groupe et tissent une toile où elles vivent et se nourrissent. Elles interrompent leur développement pour hiberner et ne reprennent leur activité qu'à la fin du mois de mars. Les adultes volent en mai et juin.

## Biologie

L'espèce se révèle par les nids de toile des chenilles. Celles-ci s'observent facilement sur les plantes nourricières (Succise des prés, Scabieuse des champs, Centaurée scabieuse, etc.).

## Répartition régionale et populations

L'espèce est encore présente sur l'ensemble de la région mais sa répartition est lacunaire et les effectifs toujours faibles.

## Habitats et mesures de gestion favorables

Le Damier de la Succise est, dans notre région, plus particulièrement inféodé aux prairies fraîches de fauche et de pâture où croissent les plantes dont sa chenille se nourrit, mais il s'observe également dans les pelouses plus sèches à Succise.

La fertilisation des prairies et la fragmentation de ses biotopes sont des causes importantes du recul de ses effectifs. La principale reste toutefois la disparition des prairies humides extensives au profit de leur mise en culture.