DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT CENTRE

Formations stables à Buis

Code Natura **5110**

Code Corine **31.82**

© MNHN-CBNBP / A. Reich

Buis (Buxus sempervirens)

© F. Olivereau

Géranium sanguin (Geranium sanguineum)

© MNHN-CBNBP / O. Bardet

Physionomie de l'habitat

Il s'agit de formations arbustives, sur sols très superficiels sur des versants bien exposés, dominées par le buis. Sous les latitudes de la région Centre, ces formations sont restreintes aux substrats squelettiques généralement calcaires. D'autres arbustes accompagnent le Buis tels que l'Épine Vinette, le Troène, le Bois de Sainte-Lucie, ainsi que des espèces herbacées des milieux chauds et secs comme le Géranium sanguin.

Caractéristiques écologiques et répartition régionale

Pour être qualifiées de stables, ces formations doivent occuper les compartiments stationnels très contraignants sur le plan hydrique : hauts de versants exposés au sud, corniches, sur roche superficielle et filtrante. La végétation xérophile et thermophile qui s'y développe évolue ainsi très difficilement vers un milieu forestier.

Fréquence : Groupements d'affinité méridionale, très rares en région Centre, à rechercher dans les zones calcaires (par exemple : la Champagne berrichonne ou la Vallée de l'Anglin).

Valeur biologique et écologique

Les groupements sont très originaux à l'échelle régionale et hébergent des espèces animales et végétales qui approchent leur limite septentrionale d'aire de répartition. Ils participent à des complexes d'habitats thermophiles et calcicoles avec des pelouses sèches et des chênaies pubescentes d'un grand intérêt sur le plan de la biodiversité (flore, champignons, insectes particuliers).

Gestion pratiquée et recommandations en faveur de la biodiversité

Dès le moment où ces formations sont relativement stables, elles sont peu menacées : elles occupent des milieux improductifs.

On veillera davantage à gérer le complexe d'habitats dans son ensemble, en maintenant une mosaïque avec des milieux plus ouverts (pelouses calcaires, habitats de dalles rocheuses).

Institut pour le Développement Forestier / DIREN Centre