

Bombina variegata



© R. Guyéant

© R. Guyéant

Description de l'espèce

Le Sonneur à ventre jaune est un petit crapaud de 40 à 50 mm de long pour un poids de 8 à 12 g. La peau est pustuleuse, le dos est gris et le ventre jaune ou orangé avec des taches noires. Les deux yeux saillants montrent une pupille en forme de cœur.

Indices de présence

Les adultes se reproduisent dans les mares et les fossés ensoleillés en mai-juin. Les oeufs accrochés par petits paquets à des brindilles immergées éclosent rapidement donnant des têtards qui se nourrissent d'algues et de micro-organismes. Les adultes consomment des vers et petits mollusques terrestres et aquatiques.

La métamorphose a lieu en juin ; les adultes atteignent leur maturité sexuelle à 3 ans et vivent 8 à 9 ans.

Au moment de la reproduction, les animaux produisent de jour comme de nuit des petits cris plaintifs audibles à quelques dizaines de mètres.

Répartition régionale et populations

Le Sonneur à ventre jaune est encore présent dans tous les départements de la région Centre à l'exception de l'Eure et Loir ; l'espèce est néanmoins rare, très localisée et en régression.

Habitats et mesures de gestion favorables

Le Sonneur habite des mares ou fossés non ombragés en permanence des sous-bois ou à proximité des zones forestières.

Durant la mauvaise saison, le Sonneur hiverne dans des fissures du sol ou dans les galeries de rongeurs.

Pour favoriser le Sonneur à ventre jaune, il est nécessaire de :

- maintenir les mares, même temporaires et certaines ornières ;
- éviter le débardage au printemps et au début de l'été dans les zones de présence de l'espèce ;
- conserver un maillage de ruisselets (ou fossés de drainage) reliés de temps à autres à des mares.