Nappe des calcaires de Beauce
situation au 12 mai 2013

PARAY-DOUAVILLE
SAINVILLE
SAINT-LEGER-DES-AUBEES
SAINT-ESCOBILLE
LA CHAPELLE D'AUNAINVILLE
MEROUVILLE
THIONVILLE
MAINVILLIERS
AUTRUY-SUR-JUINE
BOISVILLE-LA-SAINT-PERE
ANDONVILLE
CESARVILLE
FAINS-LA-FOLIE
TRANCRAINVILLE
PITHIVIERS-LE-VIEIL
BATILLY-EN-GÂTINAIS
CORMAINVILLE
RUAN
ATTRAY
CORBEILLES-EN-GÂTINAIS
LUTZ-EN-DUNOIS
EPIEDS-EN-BEAUCE
GEMINY
GIDY
TRAINOU
VILLEMOUTIERS
ORLEANS
OUZOUER-LE-MARCHE
SAINT-CYR-EN-VAL
SERIS
VILLEROMAIN
MULSANS
CHAUMONT-SUR-THARONNE
CROUY-SUR-COSSON
ISDES
BLOIS
FONTAINES-EN-SOLOGNE
MILLANCAY

Contexte géologique :

- calcaires à l'affleurement
- calcaires sous recouvrement

Tendance :

- hausse
- stabilité
- baisse

Taux de remplissage :

Très élevé	
Décennal humide	Elevé
Quinquennal humide	Normal à élevé
Normal	Normal à faible
Quinquennal sec	Faible
Décennal sec	Très faible

Le taux de remplissage est apprécié en comparant le niveau piézométrique calculé chaque semaine à sa fréquence de retour puis exprimé par classes dans une gamme de valeurs allant d'un taux de remplissage très élevé à très faible.
Les fréquences de retour sont calculées sur la période 1995-2010.
La tendance traduit l'évolution du niveau durant la semaine précédent l'analyse.