Département d'Eure-et-Loir
situation des nappes
au 9 février 2020

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

CENTRE-VAL DE LOIRE

BÛ
Craie

ALLAINVILLE
Craie

CROISILLES
Craie

CRUCEY-VILLAGES
Craie

BOULLAY-MIVOYE (LE)
Craie

RESSUINTES (LES)
Cénomanien

CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS
Craie

BOUGLAINVAL
Craie

ECROSNES
Craie

PONTGOUIN
Cénomanien

SAINT-AUBIN-DES-BOIS
Craie

PARAY-DOUAVILLE
Calcaires de Beauce

CHAPELLE D'AUNAINVILLE (LA)
Calcaires de Beauce

SAINT-ESCOBILLE
Calcaires de Beauce

HOUVILLE-LA-BRANCHE
Craie

SAINT-LEGER-DES-AUBEES
Calcaires de Beauce

SAINVILLE
sables de Fontainebleau

FRETIGNY
Jurassique Supérieur

MAGNY
Craie

BERCHERES-LES-PIERRES
Craie

THIONVILLE
Calcaires de Beauce

TRIZAY-COUTRETOT
Jurassique Supérieur

MONTIGNY-LE-CHARTIF
Cénomanien

VITRAY-EN-BEAUCE
Craie

BOISVILLE-LA-SAINT-PERE
Calcaires de Beauce

MEROUVILLE
Calcaires de Beauce

MOULHARD
Cénomanien

YEVRES
Craie

FAINS-LA-FOLIE (Ref-Beauce)
Calcaires de Beauce

TRANCRAINVILLE
Calcaires de Beauce

CHARBONNIERES
Cénomanien

BONNEVAL
Craie

LOGRON
Craie

CORMAINVILLE
Calcaires de Beauce

ARROU
Cénomanien

LANGEY
Craie

LUTZ-EN-DUNOIS (Res.Beauce)
Calcaires de Beauce

Tendance :

- hausse
- stabilité
- baisse

Taux de remplissage :

	Très élevé
Décennal humide	
	Elevé
Quinquennal humide	
	Normal à élevé
Normal	
	Normal à faible
Quinquennal sec	
	Faible
Décennal sec	
	Très faible

Le taux de remplissage est apprécié en comparant le niveau piézométrique calculé chaque semaine à sa fréquence de retour puis exprimé par classes dans une gamme de valeurs allant d'un taux de remplissage très élevé à très faible.
Les fréquences de retour sont calculées sur la période 1995-2019.
La tendance traduit l'évolution du niveau durant la semaine précédant l'analyse.

Carte produite à partir des données issues des stations gérées par le BRGM