Département d'Eure-et-Loir situation des nappes au 17 décembre 2017 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE Craie MAINTERNE LE BOULLAY-MIVOYE Craie LES RESSUINTES CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS Craie ECROSNES PARAY-DOUAVILLE Calcaires de Beauce PONTGOUIN LA CHAPELLE D'AUNAINVILLE SAINT-ESCOBILLE SAINT-AUBIN-DES-BOIS Calcaires de Beauce Calcaires de Beauce HOUVILLE-LA-BRANCHE SAINT-LEGER-DES-AUBEES Calcaires de Beauce SAINVILLE sables de Fontainebleau THÍONVILLE MAGNY FRETIGNY BERCHERES-LES-PIERRES Calcaires de Beauce Craie Jurassique Supérieur BOISVILLE-LA-SAINT-PERE TRIZAY-COUTRETOT MONTIGNY-LE-CHARTIF Calcaires de Beauce **MEROUVILLE** Cénomanien VITRAY-EN-BEAUCE Calcaires de Beauce TRANCRAINVILLE YEVRES FAINS-I A-FOLIF Calcaires de Beauce MOULHARD CHARBONNIERES BONNEVAL LOGRON Taux de remplissage : CORMAINVILLE ARROU Très élevé Décennal humide LUTZ-EN-DUNOIS LANGEY Elevé Quinquennal humide Normal à élevé Tendance: Normal Normal à faible hausse Quinquennal sec Le taux de remplissage est apprécié en comparant le niveau piézométrique stabilité Faible calculé chaque semaine à sa fréquence de retour puis exprimé par classes dans une gamme de valeurs allant d'un taux de remplissage très élevé à Décennal sec baisse Très faible Les fréquences de retour sont calculées sur la période 1995-2015. La tendance traduit l'évolution du niveau durant la semaine précédent l'analyse. Carte produite à partir des données issues des stations gérées par la DREAL Centre-Val de Loire