Département du Loir-et-Cher
situation des nappes au 5 juillet 2015

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
CENTRE-VAL DE LOIRE

SAINT-AGIL
Cénomanien

MOREE
Cénomanien

OUZOUER-LE-DOYEN
Craie

OUZOUER-LE-MARCHE
Calcaires de Beauce

FORTAN
Craie

OUCQUES
Craie

SERIS
Calcaires de Beauce

SERIS
Craie

TRÔO
Cénomanien

SAINT-RIMAY
Cénomanien

AMBLOY
Craie

VILLERCHAMPIGNY-EN-BEAUCE
Calcaires de Beauce Craie

MULSANS
Calcaires de Beauce

COUR-SUR-LOIRE
Craie

CROUY-SUR-COSSON
Calcaires de Beauce

CHAUMONT-SUR-THARONNE
Calcaires de Beauce

SANTENAY
Craie

ORCHAISE
Cénomanien

FONTAINES-EN-SOLOGNE
Calcaires de Beauce

MILLANCAY
Calcaires de Beauce

MARCILLY-EN-GAULT
Craie

CONTRES
Craie

MUR-DE-SOLOGNE
Craie

PONTLEVOY
Craie

SAINT-JULIEN-DE-CHEDON
Cénomanien

BILLY
Cénomanien

SEIGY
Cénomanien

SAINT-LOUP-SUR-CHER
Cénomanien

Tendance :

- hausse
- stabilité
- baisse

Taux de remplissage :

	Très élevé
Décennal humide	
	Elevé
Quinquennal humide	
	Normal à élevé
Normal	
	Normal à faible
Quinquennal sec	
	Faible
Décennal sec	
	Très faible

Le taux de remplissage est apprécié en comparant le niveau piézométrique calculé chaque semaine à sa fréquence de retour puis exprimé par classes dans une gamme de valeurs allant d'un taux de remplissage très élevé à très faible.
Les fréquences de retour sont calculées sur la période 1995-2010.
La tendance traduit l'évolution du niveau durant la semaine précédent l'analyse.

Carte produite à partir des données issues de stations gérées par la DREAL Centre