



Département du Loir-et-Cher

situation des nappes au

Tendance :



Taux de remplissage :



Le taux de remplissage est apprécié en comparant le niveau piézométrique calculé chaque semaine à sa fréquence de retour puis exprimé par classes dans une gamme de valeurs allant d'un taux de remplissage très élevé à très faible.
Les fréquences de retour sont calculées sur la période 1995-2015.
La tendance traduit l'évolution du niveau durant la semaine précédant l'analyse.

SAINT-AGIL
Cénomanien

OUZOUER-LE-DOYEN
Craie

OUZOUER-LE-MARCHE
Calcaires de Beauce

FORTAN
Craie

OUCQUES
Craie

SERIS
Calcaires de Beauce

TRÔO
Cénomanien

SAINT-RIMAY
Cénomanien

SERIS
Craie

AMBLOY
Craie

VILLERCHAMPIGNY-EN-BEAUCE
Calcaires de Beauce

MULSANS
Calcaires de Beauce

COUR-SUR-LOIRE
Craie

CROUY-SUR-COSSON
Calcaires de Beauce

CHAUMON
Calcaires de Beauce

SANTENAY
Craie

ORCHAISE
Cénomanien

FONTAINES-EN-SOLOGNE
Calcaires de Beauce

MILLANCAY
Calcaires de Beauce

PONTLEVOY
Craie

CONTRES
Craie

MUR-DE-SOLOGNE
Craie

SAINT-JULIEN-DE-CHEDON
Cénomanien


SEIGY
Cénomanien

BILLY
Cénomanien

SAINT-LOUP-SUR
Cénomanien

Cher

10 février 2019



Carte produite à partir des données issues de
stations gérées par le BRGM