



Département du Loir-et-Cher

situation des nappes au 14 février 2020



Taux de remplissage :



Le taux de remplissage est apprécié en comparant le niveau piézométrique calculé chaque semaine à sa fréquence de retour puis exprimé par classes dans une gamme de valeurs allant d'un taux de remplissage très élevé à très faible. Les fréquences de retour sont calculées sur la période 1995-2019. La tendance traduit l'évolution du niveau durant la semaine précédant l'analyse.

SAINT-AGIL
Cénomanien

MOREE
Cénomanien

OUZOUER-LE-DOYEN
Craie

OUZOUER-LE-MARCHE
Calcaires de Beauce

FORTAN
Craie

TRÔO
Cénomanien

SAINT-RIMAY
Cénomanien

OUCQUES
Craie

SERIS
Calcaires de Beauce

SERIS
Craie

AMBLOY
Craie

VILLEROMAIN
Calcaires de Beauce

CHAMPIGNY-EN-BEAUCE
Craie

MULSANS
Calcaires de Beauce

CROUY-SUR-COSSON
Calcaires de Beauce

CHAUMONT-SUR-THARONNE
Calcaires de Beauce

COUR-SUR-LOIRE
Craie

SANTENAY
Craie

ORCHAISE
Cénomanien

FONTAINES-EN-SOLOGNE
Calcaires de Beauce

MILLANCAY
Calcaires de Beauce

MARCILLY-EN-GAULT
Craie

PONTLEVOY
Craie

CONTRES
Craie

MUR-DE-SOLOGNE
Craie

SAINT-JULIEN-DE-CHEDON
Cénomanien

SEIGY
Cénomanien

BILLY
Cénomanien

SAINT-LOUP-SUR-CHER
Cénomanien