Neuvy le Barrois, les Îles

Le lit de l'Allier en 2000

Feuille : AI098





Echelle 1/10 000

0 50 100 200 300 400 500 m

Données extraites de la carte de végétation et de la mosaïque aérienne de juillet 2000 et complétée sur le terrain de novembre 2003 à février 2004 par le groupement SCOT / RIVE.
Cartographie effectuée par la DIREN Centre selon la typologie de morphologie fluviale.
Projection française Lambert II Etendu
Source : Service de Bassin Loire-Bretagne - DIREN Centre
5 av Buffon B.P. 6407 45064 ORLEANS CEDEX 2

©DIREN Centre-2003. Toute reproduction ou adaptation interdite
ISBN : 2-11-094563-X

Unités Hydromorphologiques

- chenal d'étiage du bras principal
- chenal d'étiage du bras secondaire
- chenal déconnecté
- boire
- rivière et canal
- étang, mare
- grève ou banc de sable
- bras mort
- île en formation
- île ancienne
- terrasse alluviale récente
- terrasse alluviale ancienne

Voies de communication

- autoroute
- nationale
- départementale
- route secondaire
- chemin
- chemin de fer
- pont canal
- route en construction

Berges

- berge naturelle érodée
- berge naturelle
- berge protégée érodée
- berge protégée

Couverture végétale

- végétations aquatiques et semi-aquatiques
- végétations herbacées pionnières typiques du lit mineur
- végétations herbacées, landes et friches à l'écart du lit mineur
- forêt alluviale
- autres forêts et boisements
- cultures
- espaces anthropiques

Ce secteur se situe entre Mars-sur-Allier et l'amont de Meauce.

Ce secteur se caractérise par la présence importante d'îles et de bancs alluvionnaires de grande importance qui identifient un type géomorphologique que l'on peu qualifier de "pseudo-tresse".
Les berges sont en générale naturelle et il n'existe que de rares dispositifs de protection.
Au niveau du Lieu Dit Les Îles La Berge présente une érosion plus marquée.
Quelques boires très éloignées du lit principal sont visibles. Elles témoignent de la dynamique ancienne de l'Allier sur l'ensemble de ce secteur.