# Livry, Château de Mauboux

## Le lit de l'Allier en 2000

### Feuille : AI095




Echelle 1/10 000

0 50 100 200 300 400 500 m

Données extraites de la carte de végétation et de la mosaïque aérienne de juillet 2000 et complétée sur le terrain de novembre 2003 à février 2004 par le groupement SCOT / RIVE. Cartographie effectuée par la DIREN Centre selon la typologie de morphologie fluviale.
Projection française Lambert II Etendu
Source : Service de Bassin Loire-Bretagne - DIREN Centre 5 av Buffon B.P. 6407 45064 ORLEANS CEDEX 2

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable

©DIREN Centre-2003. Toute reproduction ou adaptation interdite
ISBN : 2-11-094557-5

**Unités Hydromorphologiques**

- chenal d'étiage du bras principal
- chenal d'étiage du bras secondaire
- chenal déconnecté
- boire
- rivière et canal
- étang, mare
- grève ou banc de sable
- bras mort
- bouchon alluvial
- île en formation
- île ancienne
- terrasse alluviale récente
- terrasse alluviale ancienne

**Voies de communication**

- autoroute
- nationale
- départementale
- route secondaire
- chemin
- chemin de fer
- pont canal
- route en construction

**Seuils**

- seuil alluvionnaire

**Ouvrages**

- levée

**Berges**

- berge naturelle érodée
- berge naturelle
- berge protégée érodée
- berge protégée
- berge peu marquée

**Couverture végétale**

- végétations aquatiques et semi-aquatiques
- végétations herbacées pionnières typiques du lit mineur
- végétations herbacées, landes et friches à l'écart du lit mineur
- forêt alluviale
- autres forêts et boisements
- cultures
- espaces anthropiques

**Ce secteur est situé entre le Veurdre et Mauboux.**

Ce secteur se caractérise par la présence importante d'îles et de bancs alluvionnaires de grande importance qui caractérise un type géomorphologique que l'on peu qualifier de "pseudo-tresse". Le lit étant plus mobile que dans les parties rectilignes on observe différentes protections de berge en différents points clefs du secteur.
On note la présence d'une levée sur la berge rive droite qui se prolonge sur l'ensemble de ce secteur.
On note un bras mort en rive droite qui n'est plus guère caractérisable que par une dépression forte des terrasses alluviales récentes.