



Orléans, le 18 juillet 2017

Bulletin intermédiaire du 16 juin au 15 juillet 2017 État quantitatif de la ressource en eau en région Centre-Val de Loire

L'état quantitatif des ressources en eau de la région continue de se dégrader début juillet. Les débits des cours d'eau traduisent une situation hydrologique sèche à très sèche sur l'ensemble de la région. Les niveaux des nappes sont, dans l'ensemble, bas pour la saison et orientés à la baisse.

Débits de la Loire

Les débits de la Loire et l'Allier sont globalement orientés à la baisse sur la période, et malgré une remontée début juillet, ils restent sous les normales de saison. Les débits de base, observés autour du 27 juin, sont représentatifs d'une année sèche d'occurrence triennale pour la Loire, et d'une année très sèche d'occurrence septennale pour l'Allier.

En savoir plus : bulletin « InfoLoire »

<http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/archives-des-bulletins-info Loire-r219.html>

Débits des autres cours d'eau

La tendance mi-juillet est à la baisse pour la quasi-totalité des cours d'eau de la région. Les débits les plus bas sont observés, selon les cas, soit avant les pluies orageuses de fin juin, soit autour du 7 juillet. Les situations d'étiage les plus marquées sont observées au sud de la région.

Ressources souterraines

Les niveaux des indicateurs piézométriques de la région sont globalement orientés à la baisse. Seuls cinq indicateurs sur vingt-deux se situent encore au-dessus de la moyenne. Les autres présentent des niveaux bas à très bas pour la saison.

Restrictions des usages de l'eau

Au 18 juillet 2017, tous les départements de la région sont concernés par des mesures de restriction des usages de l'eau.

En savoir plus : site « propluvia »


<http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr>

ÉVOLUTION DES DÉBITS JOURNALIERS
(de septembre 2015 à mi-juillet 2016)


- débits journaliers
- débits médians
- débits forts de fréquence quinquennale
- VCN3 de fréquence quinquennale




L'Eure à Charpont




Le Loir à Villavard




L'Indre à Saint Cyran-du-Jambot




La Bouzanne à Velles




L'Essonne à Boulancourt





La Loire à Gien




La Sauldre à Salbris




Le Cher à Selles-sur-Cher




Craie Nord




Beauce Blésoise




Cénomanien Touraine




Craie Sud Indre-et-Loire




Indicateurs de situation des ressources en eau souterraine de la région Centre-Val de Loire au 16 juillet 2017



Taux de remplissage :



Tendance :



Le niveau piézométrique des principaux aquifères de la région Centre-Val de Loire est exprimé à partir d'indicateurs (moyenne de niveaux piézométriques mesurés au droit d'un ensemble de stations représentatives d'un aquifère et d'un secteur géographique donné).
Le taux de remplissage est apprécié en comparant le niveau piézométrique calculé chaque semaine à sa fréquence de retour puis exprimé par classes dans une gamme de valeurs allant d'un taux de remplissage très élevé à un taux de remplissage très faible.
Les fréquences de retour sont calculées sur la période 1995-2015.
La tendance traduit l'évolution du niveau durant la semaine précédant l'analyse.

Les données présentées sont issues du suivi des réseaux piézométriques gérés par la DREAL Centre - Val de Loire pour les départements de l'Eure-et-Loir, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret et par le BRGM – SGR Centre - Val de Loire pour les départements du Cher et de l'Indre.


D'autres éléments d'information mis à jour régulièrement sont également disponibles sur le site de la DREAL : données des piézomètres, bulletin de situation hydrologique, carte de situation des nappes par aquifère et par département.

<http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/>


Beauce centrale



Craie Est Loing



Malm Cher



Dogger libre

