

Lanius collurio



© Olivier Villa

Mâle



© Olivier Villa

Couple

Description de l'espèce

Cet oiseau est un peu plus grand que le Moineau domestique. Le mâle a le dessus de la tête gris, un bandeau noir au niveau de l'œil. Son bec est légèrement crochu. Le dos est roux foncé et le ventre blanc rosé. La queue est noire et blanche. La femelle a des colorations assez variables et peut ressembler au mâle. Cependant, la majorité des femelles est plus terne, avec un plumage plus mimétique. Migratrice, elle revient courant mai de ses quartiers d'hiver africains et repart dès le mois d'août.

Observation

C'est un oiseau assez facile à observer. En effet, on la voit souvent à l'affût, sur un arbuste, un piquet ou des fils barbelés.

Lors de la nidification, on voit souvent les adultes transporter les proies vers le même buisson, ce qui permet de prouver la nidification de l'espèce. La meilleure période pour recenser les couples nicheurs est la fin juin début juillet. Plus rarement, on peut retrouver des proies empalées sur les épines d'un arbuste, la Pie-grièche écorcheur constitue ainsi un garde-manger.

Distribution et effectifs

Elle niche en Europe, de l'Oural à l'Atlantique, mais elle est absente dans le nord de l'Europe et dans le sud de l'Espagne.

La population européenne est de 2 500 000 à 5 000 000 de couples.

Les effectifs nicheurs en France sont de 160 000 à 360 000 couples. Elle est absente ou peu présente au nord d'une ligne joignant Nantes à Charleville-Mézières. Elle n'occupe pas la bordure méditerranéenne.

En région Centre, elle est encore bien présente dans les zones où l'élevage est toujours présent.

Habitats et mesures de gestion favorables à l'espèce

Cet oiseau est inféodé aux prairies bordées de haies éparses et de faible hauteur. La Pie-grièche écorcheur affectionne les buissons de prunellier ou d'autres arbustes épineux. Elle utilise également les pelouses calcaires quand celles-ci commencent à s'embroussailler.

Elle se nourrit principalement d'insectes mais il lui arrive de capturer de petits rongeurs, voire de jeunes oiseaux. Elle utilise parfois les épines des buissons qu'elle occupe pour y empaler les proies non consommées et se faire ainsi des réserves de nourriture (d'où son nom d'écorcheur). La présence de bétail semble être très appréciée par la Pie-grièche écorcheur (présence d'insectes...). Il faudrait veiller au maintien des milieux ouverts (prairies...). En effet, les mises en culture des prairies ainsi que l'implantation de nombreuses peupleraies se multiplient ces dernières années.

De nombreuses mesures agri-environnementales permettraient le maintien de cette espèce :

- entretien des haies existantes ;
- plantation de haies ;
- maintien des prairies avec des mesures adaptées à l'avifaune (fauche tardive, chargement modéré en bétail...) ;
- utilisation raisonnable des intrants pour favoriser le développement des insectes..

Ces mesures doivent tenir compte des besoins de l'oiseau, notamment pour la plantation des haies, où il faudrait privilégier les essences locales (prunelliers, aubépines...).